2e.

n°. 16. | observation | Lu e 2.

sur les effets de la lésion du rameau frontal
de la premiere branche de la cinquieme —
paire; nommée opthalmique de Willis.

M. de St Eglan, de la compagnie des gendarmes Bourguignons
tirant des armes avec un de ses camarades, le fleuret de ce
dernier se rompit, et l'extrémité inégale de la portion qui —
lui restoit à la main blessa M. de St Eglan sur le trou —
sourcilier, ou orbitaire supérieur droit de l'os frontal. il —
demeura, pendant trois à quatre jours à l'hotel, dans un —
léger assoupissement. le chirurgien de sa compagnie le —
saigna deux fois: mais cet etat s'aggravant, on apporta —
le blessé à l'hopital de la gendarmerie le 31 xbre 1778. —
je prescrivis les différentes saignées, les pedi-luves, les lavemens
purgatifs et l'infusion d'arnica. l'assoupissement se dissipa,
de maniere qu'il fut sortir de l'infirmerie le 14 janvier —
suivant: mais il lui resta pendant plusieurs mois une —
perte de mémoire, qui a diminué par la suite d'une —
maniere insensible, et qui n'a cessé absolument qu'au —
mois d'octobre 1779, lorsqu'il a été rendu chez lui, pour —
y passer son semestre.

il paroit utile de remarquer la différence des effets de cette
blessure chez mon sujet, avec ceux rapportés par M. —
sabatier dans son anatomie.

hippocrate, dit-il, a avancé dans ses prénotions que la —
vue s'obscurcit chez ceux qui sont blessés au sourcil et un —
peu plus haut.

M. sabatier ajoute que Camerarius et Morgagni ont —
confirmé cette observation par l'expérience.

Saucerotte
associé de l'acad. R. de
chirurgie.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 48 n° 16